



Česká chirurgická společnost ČLS J.E. Purkyně
Sokolská 31, 120 26 Praha 2

předseda: Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
místopředsedové: Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.
vědecký sekretář: Doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.

Ing. Marie Ředinová
České ILCO a
Informační a poradenské centrum
Polská 15
120 00 Praha 2

v Brně dne 31. března 2020

Věc: Stanovisko výboru ČCHS ČLS JEP – Podpora návrhu na úpravu zvýšení limitu v indikovaných případech pro všechny děti do 6 let

Vážená paní předsedkyně,

dovoluji si Vás informovat, že výbor České chirurgické společnosti ČLS JEP podporuje Váš návrh na navýšení limitu vhodných stomických prostředků pro všechny dětské pacienty ve věkové skupině 0-6 let, a to z níže uvedených důvodů.

V příloze 3C zákona 48/97 Sb. je zvýšení limitu stomických pomůcek uveden jen u skupiny s malou lepící plochou – skupina 03.05. Tuto skupinu využívají pro jímání odpadu ze stomie novorozenci a kojenci. Větší děti mezi 1-2 rokem začínají používat stomické pomůcky s mini a midi systémy – standardně určené dospělým pacientům. Používají sáčky vypouštěcí, uzavřené i urostomické.

Děti mají v rámci přirozeného psychomotorického vývoje zvýšené nároky na pohyb a nejsou schopné posoudit následky svého jednání. Stomie u většiny těchto dětí bývá vyšitá na horním úseku tenkého střeva z důvodu různých onemocnění (CIPO – chronická střevní pseudoobstrukce, Hirschsprungova choroba). Takováto stomie denně produkuje několik litrů tekutého a ke kůži agresivního odpadu. Dochází u nich k častějšímu podtékání pomůcek.

sekretariát ČCHS: Hana Baráčková tel.č. : 53223 2983 Barackova.Hana@fnbrno.cz
Eva Kysilková tel.č. : 53223 2688 Kysilkova.Eva@fnbrno.cz
Chirurgická klinika FN Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno



Česká chirurgická společnost ČLS J.E. Purkyně
Sokolská 31, 120 26 Praha 2

předseda: Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
místopředsedové: Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.
vědecký sekretář: Doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.

Pomůcky s malou lepicí plochou větším dětem nevyhovují. Dochází k podráždění kůže v okolí stomie a zvyšují se náklady spojené s hojením podrážděné a bolestivé pokožky. S tím souvisí nutnost navýšení limitu i u dalších pomůcek jako jsou pasty, kroužky, přídržné a vyrovnávací pásy a ostatní stomické příslušenství.

Pro zařazení dětí do kolektivu a jejich dalšího psychosociálního vývoje je vhodná pomůcka nezbytná.

Úprava se bude týkat malého počtu pacientů v řádu několika desítek. Většina střevních vývodů u novorozeneckých dětí je uzavřena do 1 roku věku dítěte.

S úctou a pozdravem

.....
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
předseda České chirurgické společnosti ČLS JEP